


完璧なNCLEX-RN無料試験 &合格スムーズNCLEX-RN学習資料 |最新のNCLEX-RN試験問題解説集



BONUS!!! It-Passports NCLEX-RNダンプの一部を無料でダウンロード: <https://drive.google.com/open?id=1qeJ9tI2LhA0DJXk3zTdTkWGCZe6o2aoS>

NCLEX-RN試験に実際に参加して資料を選択する前に、このような証明書を保持することの重要性を思い出してください。このようなNCLEX-RN証明書を取得することで、昇給、昇進の機会、上司や同僚からの信頼など、将来の多くの同意結果を習得できます。これらすべての快い結果は、もはやあなたにとって夢ではありません。

NCLEX-RN試験は、テストテイカーのパフォーマンスに応じて、75~265の質問で構成されています。質問はコンピューターで生成されており、安全で効果的なケア環境、健康増進と維持、心理社会的完全性、生理学的完全性の4つの分野でテストテイカーの知識をテストするように設計されています。この試験は、テストテイカーの批判的思考と問題解決能力、および健全な看護判断を下す能力をテストするように設計されています。

NCLEX-RN試験は、選択式の問題や選択肢をすべて選択する問題、空欄を埋める問題、順序を指定する問題など、さまざまな形式の問題から構成されます。試験は「安全で効果的なケア環境」、「健康促進と維持」、「心理的整合性」、「生理的整合性」の4つのカテゴリに分けられます。各カテゴリは感染対策、倫理的・法的問題、精神保健、基本的なケアや快適さなど、さまざまなトピックをカバーしています。NCLEX-RNは難しい試験であり、受験者は十分に準備する必要があります。レビューコース、学習資料、練習問題など、準備するための多くのリソースがあります。NCLEX-RNに合格することは、看護の実りあるキャリアに向けた重要なステップであり、大きな成果です。

>> NCLEX-RN無料試験 <<

ハイパスレートのNCLEX-RN無料試験と認定したNCLEX-RN学習資料

ますます多くの企業が、候補者のNCLEX-RN認定に高い注意を払うようになってきていることがわかっています。これらの企業のリーダーはこれらの候補者を深く理解するのが難しいため、候補者が獲得したNCLEX-RN認定により、すべてのリーダーが自社の優秀な労働者を選択する最良かつ迅速な方法です。NCLEX-RN認定が多くの人々にとってますます重要になっていることは間違いありません。また、NCLEX-RN試験問題もあります。NCLEX-RN認定を簡単に取得できます。

NCLEX NCLEX-RN 認定試験の出題範囲:

トピック	出題範囲
トピック 1	心理社会的インテグリティ: この試験セクションでは、精神保健看護師のスキルを評価し、感情面、精神面、そして社会的なウェルビーイングを網羅します。心理的ニーズ、薬物使用、虐待、悲嘆、そして対処課題の評価が含まれます。看護師は、治療的コミュニケーションを活用し、心理社会的ストレス要因を認識し、文化的配慮を維持しながら行動障害のあるクライアントを支援する必要があります。
トピック 2	生理学的完全性: この試験セクションでは、急性期ケア看護師のスキルを評価し、4つのサブドメインを通して身体的健康の維持に焦点を当てます。「基本ケアと快適性」では、日常生活動作のサポートと快適性対策を評価します。「薬理学的および非経口療法」では、安全な投薬と患者のモニタリングについて扱います。「リスク潜在性の軽減」では、合併症を検知し予防する能力を評価します。「生理学的適応」では、臨床介入を用いて、急性、慢性、または生命を脅かす健康状態にある患者の管理能力を評価します。
トピック 3	健康促進と維持: この試験セクションでは、臨床看護教育者のスキルを評価し、健康維持と疾病予防のための戦略を網羅します。年齢層を問わないクライアント教育、産前産後ケア、地域の健康促進などが含まれます。看護師は、スクリーニングの実施、リスク要因の認識、学習ニーズと準備状況に基づいた教育の適応能力が試されます。
トピック 4	安全で効果的なケア環境: この試験セクションでは、登録看護師のスキルを評価し、安全で効果的な医療環境を維持しながらクライアントのケアを管理する方法を網羅します。ケアマネジメントでは、学際的なチームとの連携、権限委譲、法的責任、リソースの活用を評価します。また、安全と感染管理では、感染予防、安全な機器の使用、緊急時の対応、環境ハザードへの対応を通じて、クライアントとスタッフのリスクを最小限に抑えることに焦点を当てます。

NCLEX National Council Licensure Examination(NCLEX-RN) 認定 NCLEX-RN 試験問題 (Q763-Q768):

質問 # 763

A female client admitted to the labor and delivery unit thinks her bag of water "broke" approximately 2 hours ago. She is having mild contractions 5 minutes apart. The most immediate nursing intervention would be to:

- A. Note the color and amount of fluid on her clothes.
- B. **Assess the FHR.**
- C. Place the nitrazine test paper at the cervical os and note the color change.
- D. Notify the physician.

正解: B

解説:

(A) Amniotic fluid is generally pale and straw colored. Meconium- stained amniotic fluid would indicate a previous hypoxic episode. This intervention, though appropriate, is not the immediate priority. (B) With rupture of the membranes, the umbilical cord may prolapse if the presenting part does not fill the pelvis. Assessing FHR ascertains fetal well-being. (C) More information regarding fetal status and assessing for membrane rupture is needed prior to contacting the physician. (D) Nitrazine test paper differentiates amniotic fluid from urine. Amniotic fluid is normally alkaline in contrast to urine, which is acidic. This intervention, though appropriate, is not the immediate priority.

質問 # 764

A 10-month-old infant's mother says that he takes fresh whole milk eagerly, but that when she offered him baby foods at 6 months of age, he pushed them out of his mouth. Because he has gained weight appropriately, she has quit trying to get him to eat other foods. The nurse's response is based on the knowledge that:

- A. Milk is an excellent food and will meet his nutritional needs adequately until he is ready to eat solid foods
- B. He should be started on iron-enriched cereal, meat, vegetables, fruits, and juices prior to bottle feeds. Milk intake should be limited to 1 qt/day
- C. Milk intake should be limited to no more than four 8-oz bottles per day and should be followed by iron-enriched cereal or other solid foods or juices
- D. It is acceptable to continue to give him whole milk and to delay giving solid foods as long as he takes a vitamin supplement daily

正解: B

解説:

Section: Questions Set D

Explanation:

(A) If the infant is given the bottle first, he will be less likely to be hungry enough to eat the solid foods. (B) Milk is deficient in iron, vitamin C, zinc, and fluoride. It does not provide an adequate diet. (C) The vitamin supplement will help, but the infant needs an iron supplement. (D) Giving the solid food when the infant is hungriest will increase the likelihood that he will eat. The more solid food he takes, the less milk he will desire.

質問 # 765

A 48-hour-old male infant is ordered to have phototherapy. When his mother questions the nurse about its purpose, the nurse explains that phototherapy:

- A. Breaks down bilirubin in the skin into substances that can be excreted in stool or urine
- B. Increases levels of unconjugated bilirubin, thereby preventing kernicterus (brain damage)
- C. Assists the baby's clotting mechanism
- D. Prevents the development of ophthalmia neonatorum

正解: A

解説:

Section: Questions Set E

Explanation:

(A) The instillation of erythromycin ophthalmic preparation, not phototherapy, prevents ophthalmia neonatorum.

(B) The administration of vitamin K (AquaMEPHYTON) assists the infant's clotting mechanism. (C) Excessive bilirubin accumulates when the infant's liver cannot handle the increased load caused by the breakdown of red blood cells postnatally. This excessive bilirubin seeps out of the blood and into the tissues, staining them yellow. Phototherapy accelerates the removal of bilirubin from the skin by breaking it down into substances that can be excreted in stool or urine. (D) Phototherapy decreases levels of unconjugated bilirubin, thereby preventing kernicterus.

質問 # 766

Succinylcholine chloride (Anectine) is ordered prior to electroconvulsive therapy treatment for depressed clients. The nurse explains that the purpose of the drug is to:

- A. Relax muscles
- B. Relieve anxiety
- C. Reduce secretions
- D. Act as an anesthetic

正解: A

解説:

Explanation:

(A) Succinylcholine chloride relaxes muscles and decreases the intensity of the seizure. (B) Succinylcholine chloride does not relieve

- [illegible]

myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt,
myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes

P.S.It-PassportsがGoogle Driveで共有している無料の2026 NCLEX NCLEX-RNダンプ: <https://drive.google.com/open?id=1qeJ9tI2LhA0DJXk3zTdTkWGCZe6o2aoS>